Continue

إرشادات علاج التهاب الأذن الوسطى aapc

النموذجية لمعجم الأذن الوسطى ما بين العلاج الدوائي والجراحي. يعد التهاب الأذن الوسطى من الالتهابات [illegible] 6 - 36 شهرًا. أسندت [illegible] 40% من مجموع عدد الزيارات لدى أطباء الأطفال. يظهر هذا المرض غالبًا كأسباب [illegible] تغب دائم في طبلة الأذن. انخفاض في القدرة على السمع. التهاب الحنجرة 2, 4 [illegible]

تشخيص التهاب الأذن الوسطى عن طريق الفحص السريري للأعراض والاستماع إلى الأذن. يمكن أيضًا استخدام أدوات التشخيص مثل المنظار الأذني واختبار قياس الطبلة لتحديد مدى تأثير التهاب الأذن على الأذن الوسطى والطبلة الأذنية. علاجات التهاب الأذن الوسطىتختلف خيارات علاج التهاب الأذن الوسطى اعتمادًا على شدة العدوى وعمر المريض. يمكن أن تتضمن علاجات التهاب الأذن الوسطى استخدام المسكنات لتخفيف الألم والمضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية. قد تشمل العلاجات الأخرى إدخال أنبوب صغير في طبلة الأذن لتصريف السوائل وتهوية الأذن الوسطى. العلاج الطبيعي لالتهاب الأذن الوسطىيعرف الأشخاص بفضلون اللجوء إلى العلاج الطبيعي لتهدئة أعراض التهاب الأذن الوسطى. يمكن أن يشمل العلاج الطبيعي لالتهاب الأذن الوسطىتغيير النظام الغذائي وتناول المكملات الغذائية وممارسة التمارين الرياضية وممارسة اليوجا والتأمل. يجب على الطبيب تقديم التشخيص الدقيق وتحديد العلاج المناسب للحالة المحددة. يمكن أن يشمل العلاج المضادات الحيوية إذا كان التهاب الأذن الوسطى ناتجًا عن عدوى بكتيرية. وكذلك تناول المسكنات لتخفيف الألم والتورم. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إجراءات أخرى مثل إدخال أنبوب صغير في الأذن الوسطى للتخلص من السوائل المتراكمة. ينبغي عدم تأخير العلاج والاستمرار في تناول الأدوية حتى الشفاء الكامل. من المهم العناية بالأذن بعد العلاج لتجنب الاحمرار والتورم.من المهم ملاحظة أن الأعراض قد تختلف من شخص لآخر تبعًا لشدة العدوى وحالة الجهاز المناعي للفرد.عند ظهور أي أعراض تشير إلى التهاب الأذن الوسطى لدى البالغين، من المهم استشارة الطبيب الخاص بالأذن والأنف والحنجرة. يجب على الطبيب تقديم التشخيص الدقيق وتحديد العلاج المناسب للحالة المحددة. يمكن أن يشمل العلاج المضادات الحيوية إذا كان التهاب الأذن الوسطى ناتجًا عن عدوى بكتيرية، وكذلك تناول المسكنات لتخفيف الألم والتورم. قد يحتاج بعض الأشخاص إلى إجراءات أخرى مثل إدخال أنبوب صغير في الأذن الوسطى للتخلص من السوائل المتراكمة. ينبغي عدم تأخير العلاج والاستمرار في تناول الأدوية حتى الشفاء الكامل.