I'm not a robot

Gracias a su composición, Hidrasec corta la diarrea aguda sin hinchazón abdominal ni estreñimiento adicional Nuevo diccionario multilingüe sobre diarrea. Llévatelo de viaje contigo. Descarga e imprime Hidrasec con Racecadotrilo es un medicamento antidiarreico, para adultos, que actúa localmente regulando el paso del agua al intestino. Este medicamento tiene una rápida acción antidiarreica sin modificar el tiempo de tránsito intestinal, sin provocar estreñimiento adicional, ni distensión abdominal.Ver más Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN: Cada sobre contiene:Racecadotrilo 10 mg, 30 mgExcipiente cbp INDICACIONES TERAPÉUTICAS: HIDRASEC® es un antidiarreico que está indicado como terapia adjunta a la rehidratación oral o parenteral en el tratamiento de la diarrea aguda en niños y lactantes de 3 meses de edad y mayores. FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA: Propiedades farmacocinéticas: Racecadotrilo se absorbe rápidamente por vía oral. Se hidroliza rápidamente a (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil) glicina; su metabolito activo que es convertido en metabolitos inactivos que se eliminan a través de los riñones, heces y pulmones.El grado y duración de la acción de racecadotrilo depende de la dosis administrada.La actividad máxima contra la encefalinasa plasmática se logra después de 2½ horas y corresponde a la inhibición de 90% de la actividad enzimática después de una dosis administrada de 1,5 mg/kg.La vida media biológica de Racecadotrilo es de 3 horas. Para una dosis de 100 mg, la duración de la actividad contra la encefalinasa plasmática es de 8 horas.El (RS)-N-(1-oxo-2-(mercaptometil)-3-fenilpropil) glicina, el metabolito activo de Racecadotrilo se une a un 90% de la proteína plasmática, principalmente a la albúmina. La distribución tisular sólo afecta alrededor del 1% de la dosis administrada.Las propiedades farmacocinéticas de racecadotrilo no cambian con la administración repetida o en personas mayores. La biodisponibilidad de racecadotrilo no se altera con los alimentos, pero su actividad máxima se retrasa una hora y media.Propiedades farmacodinámicas: HIDRASEC® es un inhibidor de la encefalinasa, la enzima responsable del desdoblamiento de las encefalinas. Es un inhibidor selectivo pero reversible, y protege las encefalinas endógenas que son fisiológicamente activas en el tubo digestivo.HIDRASEC® tiene un agente antisecretor intestinal que ha demostrado no tener ningún efecto en la motilidad gastrointestinal, reduce la hipersecreción intestinal de agua y electrólitos que provoca la toxina del cólera o la inflamación, sin afectar la secreción basal. Por lo tanto, no tiene ningún efecto en el intestino normal.Cuando se administra por vía oral, la inhibición de la encefalinasa sólo es periférica.HIDRASEC® no afecta la actividad de la encefalinasa del sistema nervioso central y no se ha demostrado que produzca hábito, efecto estimulante o sedante en este mismo. CONTRAINDICACIONES: Contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a racecadotrilo o algún otro ingrediente de la formulación. Puesto que la sacarosa es una fuente de glucosa y fructosa.HIDRASEC® no debe usarse en personas con intolerancia a la fructosa, síndrome de absorción deficiente de glucosa/galactosa o deficiencia de sacarosa isomaltosa. RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA: No se tienen disponibles datos adecuados del uso en humanos durante el embarazo. Sin embargo, en estudios en animales no se ha identificado ningún riesgo para el embarazo y el desarrollo embrionario-fetal. HIDRASEC® no debe usarse durante el embarazo a menos que los posibles beneficios sobrepasen los riesgos.No se tienen disponibles datos adecuados del uso en humanos durante la lactancia. Sin embargo, en estudios en animales no se ha identificado ningún riesgo d urante la lactancia o para el lactante. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS: Aunque se observaron varios eventos adversos en la población de pruebas clínicas, estos eventos fueron similares en cuanto a su naturaleza y se observaron con la misma frecuencia e intensidad en poblaciones con placebo.No se ha identificado ningún efecto adverso en la capacidad de conducir u operar maquinaria. PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD: No se ha reportado información de relevancia. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO: No se han realizado estudios específicos en humanos, racecadotrilo no inhibe o estimula el citocromo P-450 en modelos animales. ALTERACIONES EN LOS RESULTADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO: No se han reportado hasta el momento. PRECAUCIONES GENERALES: En pacientes diabéticos, debe tomarse en cuenta el contenido de azúcar por cada sobre, por ejemplo, 580 mg (sobre de 0.5 g) 1740 mg (sobre de 1.8 g) 2900 mg (sobre de 3.0 g) de sacarosa.Si la cantidad de sacarosa (fuente de glucosa y fructosa) proporcionada por HIDRASEC® excede a 5 g/día, deberá tomarse en cuenta en la ración diaria.Deben tomarse precauciones en pacientes con insuficiencia renal o hepática debido a la ausencia de experiencia clínica en estos grupos. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: HIDRASEC® debe administrarse junto con un tratamiento de rehidratación oral o parenteral en lactantes y niños.La lactancia debe continuar cuando sea el caso.La dosis recomendada para HIDRASEC® es de 1.5 mg/kg de peso corporal, 3 veces al día.La dosis diaria total no debe exceder de aproximadamente 8 mg/kg.En la tabla de abajo se expone la dosis normal según el peso y la edad del lactante o el niño.Considerar el peso del niño para calcular la dosis. Si esto no es posible, tomar la edad del niño. Edad No. de sobres por toma De 3 a 9 meses (menos de 9 kg aprox.) 1 sobre de 10 mg por toma De 9 a 30 meses (de 9 a 12 kg aprox.) 2 sobres de 10 mg por toma De 30 meses a 9 años (de 13 a 27 kg aprox.) 1 sobre de 30 mg por toma Más de 9 años (más de 27 kg) 2 sobres de 30 mg por toma Junto con las sales de rehidratación oral, el tratamiento debe de iniciarse con el número de sobres recomendados sin tomar en cuenta el tiempo. Las dosis subsecuentes deben administrarse cada 8 horas hasta que cese la diarrea.Si los síntomas persisten por más de 5 días, el paciente debe de acudir a consulta médica. Instrucciones de uso: 1. Directamente en la boca del niño. HIDRASEC® puede administrarse vaciando el contenido de los sobres directamente sobre la lengua del niño. 2. Con agua. Abra el sobre de HIDRASEC® pediátrico cortando por la parte superior como está indicado. Vierta los gránulos de HIDRASEC® a una pequeña cantidad de agua limpia. Agite el agua y los gránulos vigorosamente y dé a beber al niño inmediatamente. 3. Con alimentos. HIDRASEC® también puede mezclarse con una pequeña cantidad de alimento en una cuchara. Cualquiera que sea el método de administración, es importante asegurarse que el niño ingiera toda la dosis requerida. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL: No existen datos de sobredosificación en niños, sin embargo, en adultos, en los estudios clínicos se han administrado dosis únicas de 2 g (es decir 20 veces la dosis para adulto en el tratamiento de diarrea aguda) sin causar efectos dañinos.No se ha reportado ningún caso de sobredosificación accidental. No se ha identificado ningún antídoto específico, en caso de sobredosificación deben seguirse los procedimientos reconocidos. PRESENTACIONES: Caja con 18 sobres de 10 mg e instructivo anexo.Caja con 18 sobres de 30 mg e instructivo anexo. RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO: Consérvese a no más de 30°C.Consérvese la caja bien cerrada. LEYENDAS DE PROTECCIÓN: No se deje al alcance de los niños. Su venta requiere receta médica. Literatura exclusiva para médicos. No use durante el embarazo o lactancia. Antes de administrar, léase instructivo anexo. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx ymfarmacovigilancia@ferrer.com Hecho en España por: Ferrer Internacional, S.A. c/, Joan Buscallà, 1-9 08173 Sant Cugat del Vallès Barcelona, España Representante legal e importador: Ferrer Therapeutics, S.A. de C.V. Av. Insurgentes Sur 664, piso 9 Col. Del Valle, C.P. 03100 Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México Almacenado y Distribuido por: FERRER THERAPEUTICS, S.A. de C.V. Prolongación Saturno No. 456-B, Bodega 5 Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700 Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México Reg. Núm. 125M2000, SSA IV ®Marca Registrada Preguntado por: Ismael Montes | Última actualización: 13 de marzo de 2022Puntuación: 4.3/5 (43 valoraciones) Qué es Hidrasec y para qué se utiliza Hidrasec es un medicamento que contiene racecadotrilo como principio activo. Está indicado en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto Hidrasec?Luego de la toma oral, a los 30 minutos ya comienza a hacer efecto y luego de 1 a 3 horas tiene su efecto máximo que dura hasta 8 horas.¿Cómo se toma el Hidrasec sobres?HIDRASEC® debe administrarse junto con un tratamiento de rehidratación oral o parenteral en lactantes y niños. La lactancia debe continuar cuando sea el caso. La dosis recomendada para HIDRASEC® es de 1.5 mg/kg de peso corporal, 3 veces al día. La dosis diaria total no debe exceder de aproximadamente 8 mg /Kg.¿Cuál es el generico de Hidrasec?El racecadotrilo es un medicamento empleado para el tratamiento de la diarrea por su capacidad de controlar la secreción intestinal de agua y electrolitos.¿Cómo se toma el Hidrasec pediátrico?DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN: La dosis diaria recomendada es de 1,5 mg/kg por toma (correspondientes a 1-2 sobres), 3 veces al día, cada 8 horas.20 preguntas relacionadas encontradasModo de Empleo: Instrucciones de uso: Con agua. Abra el sobre de Hidrasec® cortando por la parte superior como está indicado. Vierta a una pequeña cantidad de agua limpia. Agite el agua y los gránulos vigorosamente y dé a beber al niño inmediatamente.Hidrasec® está indicado para el tratamiento de la diarrea aguda Hidrasec® es un antisecretor - antidiarreico indicado como terapia adjunta a la rehidratación oral o parenteral en el tratamiento de la diarrea aguda en niños y lactantes de 1 mes de edad y mayores.$208.00. Hidrasec granulado en sobres 18 pzas de 30 mg c/u, racecadotrilo.En forma general podemos indicar que el Tiorfan se emplea más para tratamientos cortos de forma aguda y el Fortasec aunque también se puede emplear en casos agudos, se prefiere reservarlo para casos crónicos por su mayor seguridad.El precio de Fortasec ronda los 10 euros.El tratamiento debe mantenerse hasta que se produzcan 2 deposiciones normales. La duración máxima del tratamiento será de 2 días.Hidrasec es uno de los mejores medicamentos que se pueden encontrar en el mercado para combatir problemas de diarrea debido a sus propiedades antisecretoras, por lo que actúa como una terapia que no produce deshidratación.Tomar agua es el primer paso para rehidratarse. También se puede preparar una solución de rehidratación oral (SRO) mezclando 1 litro de agua con media cucharadita de sal y 6 cucharaditas de azúcar. Consumir azúcar y sal con agua ayuda a los intestinos a absorber los líquidos de forma más eficiente.Tome de 8 a 10 vasos de líquidos claros por día. ... Tome al menos 1 taza (240 mililitros) de líquido cada vez que tenga una deposición suelta.Consuma comidas pequeñas a lo largo del día, en lugar de 3 comidas grandes.Tiorfan se presenta en forma de cápsulas. La dosis habitual es de una cápsula tres veces al día que debe tragarse acompañada de un vaso de agua. Tiorfan debe tomarse preferentemente antes de las comidas principales pero, para empezar con su tratamiento, puede tomar una cápsula de Tiorfan en cualquier momento del día.Algunos tipos de cáncer pueden provocar diarrea, incluidos los tumores que producen hormonas (neuroendócrinos), como el síndrome carcinoide y el síndrome de Zollinger - Ellison, el cáncer de colon, el linfoma, el carcinoma medular de la glándula tiroides y el cáncer de páncreas.Racecadotrilo (comercializado como Tiorfan) es una nueva molécula que inhibe la hipersecreción intestinal sin enlentecer el tránsito. No tiene efectos secundarios sobre el sistema nervioso central y además puede administrarse en lactantes a partir de tres meses.$170.00. Hidrasec 10 mg granulado en sobres 18 pzas, racecadotrilo.Farmacias del Ahorro | HIDRASEC/ Granulado | Tienda en línea a todo México.Tiorfan es un medicamento para el tratamiento de la diarrea. Tiorfan se usa en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda en niños mayores de 3 meses.Hidrasec es un medicamento que contiene racecadotrilo como principio activo. Está indicado en el tratamiento de los síntomas de la diarrea aguda inespecífica en adultos. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 2 días.Cómo tomar agua con limón para la diarreaUna de ellas es mezclar el zumo de limón con agua para ir tomándolo. Su ventaja es que el sabor se suaviza bastante. ... Otra opción es coger una botella, jarra o vaso muy grande para llenarla de agua y añadir unos trozos de limón.Que es mejor el ipríkene o hridrasec? Ambos medicamentos son antidiarreicos y tienen mecanismos de acción diferentes, pero tienen la misma efectividad, siempre y cuando se valore adecuadamente el caso. No hay diferencia en ellos y depende de la experiencia y preferencia de su médico.La loperamida actúa sobre los receptores opiáceos de los intestinos, retrasando su movimiento. Esto reduce el número de deposiciones y torna menos acuosas las heces. La loperamida está aprobada para su uso en adultos, en dosis únicas de 4 mg para la primera dosis, seguida de 2 mg después de cada evacuación suelta.La lactulosa es un azúcar sintético usado para tratar el estreñimiento (constipación). Se procesa en el colon en sustancias que extraen el agua del cuerpo y la evacuan hacia el colon. Esta agua ablanda las heces. HIDRASEC 10 mg Gr⁄nulos para Soluci⁄n Oral en Sobres FERRER Cápsulas de 100 mg y granulado de 10 y 30 mg.El Hidrasec es un tratamiento para la diarrea aguda en adultos, niños y bebés de más de tres meses de edad.Mecanismo de acciónEl racecadotril es conocido como un pro-fármaco. Una vez dentro del organismo, se descompone en el ingrediente activo tiorfano, que funciona al reducir la cantidad de líquido y sales secretadas en el intestino.Esto hace que se origine una reducción de agua y electrolitos a la luz intestinal.DosisEn adultos mayores de 18 años, se debe administrar una cápsula de Hidrasec de 100 mg, inicialmente y luego continuar con una dosis de una capsula de Hidrasec de 100 mg, con cada una de las comidas principales.En niños 30 mg , se utiliza para niños y adolescentes que pesan 13 kg o más.La dosis habitual para niños que pesan entre 13 kg y 27 kg es una dosis de 30 grs tres veces al día. Para los niños que pesan más de 27 kg, la dosis es de dos sobres tres veces al día.Para niños que pesan menos de 13 kg, la dosis habitual para niños que pesan menos de 9 kg es de 30 grs tres veces al día.Para los niños que pesan entre 9 kg y 13 kg, la dosis es de dos sobres tres veces al día.Los gránulos de Hidrasec para bebés y niños para suspensión pueden mezclarse con alimentos, dispersarse en un vaso de agua o agregarse a un biberón para bebés.Los gránulos deben mezclarse bien y administrarse inmediatamente después de mezclar.El tratamiento con Hidrasec deben prolongarse hasta que se logren dos deposiciones normales diarias.En los casos donde el cuadro de diarrea no pueda controlarse después de iniciar el tratamiento, se debe consultar al médico.El Hidrasec no debe tomarse por más de siete días.Efectos secundariosLos medicamentos y sus posibles efectos secundarios pueden afectar a las personas de diferentes maneras.Los siguientes son algunos de los efectos secundarios que pueden estar asociados con Hidrasec.El hecho de que se puedan presentar efectos secundarios, no significa que todas las personas que toman este medicamento experimentarán ese o cualquier efecto secundario.Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos.Deje de usar Hidrasec y consulte a su médico si tiene alguno de estos síntomas:Inflamación severa de los labios, cara, lengua o garganta (angioedema).Enrojecimiento de la piel debido al ensanchamiento de los pequeños vasos sanguíneos (eritema).Picazón.Erupción cutánea grave como eritema multiforme.Bultos rojos tiernos debajo de la piel, generalmente en las pantorrillas (eritema).Náuseas, vómito y estreñimiento.Dolor de cabeza y mareos en adultos.Advertencias y contraindicacionesEl Hidrasec se debe usar teniendo en cuenta la hidratación del paciente.Esto es particularmente importante para las personas y los niños frágiles y ancianos.El Hidrasec está contraindicado en:Bebés menores de tres meses.Niños con problemas renales o hepáticos.Personas con diarrea que contengan mucosidad o sangre, heces de color amarillo o verdoso, o que también tengan fiebre.Personas con diarrea crónica o diarrea que comenzaron durante o después de un ciclo de antibióticos.Personas con vómitos prolongados o incontrolados, ya que es posible que el medicamento no se absorba adecuadamente y, por lo tanto, sea menos efectivo en esta situación.Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.Las cápsulas de Hidrasec contienen lactosa y no deben ser tomadas por personas con problemas hereditarios raros de intolerancia a la galactosa, la deficiencia de lactasa Lapp o la malabsorción de glucosa-galactosa.Los gránulos de Hidrasec para lactantes y niños para suspensión contienen sacarosa y no son adecuados para niños con problemas hereditarios raros de intolerancia a la fructosa, malabsorción de glucosa-galactosa o insuficiencia de sacarosa-isomaltasa.El contenido de azúcar debe tenerse en cuenta en los niños con diabetes .InteraccionesEste medicamento no se sabe que afecte a otros medicamentos.Sin embargo, al igual que con todos los medicamentos, es importante que se informe al médico de los medicamentos que se está administrando, incluidos los comprados sin receta y los medicamentos naturales a base de hierbas, antes de comenzar el tratamiento con Hidrasec.Del mismo modo, se debe consultar con el médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento nuevo mientras toma Hidrasec, para asegurarse de que la combinación sea segura. Hidrasec es un medicamento antidiarreico utilizado para condiciones no crónicas de este padecimiento. Funciona mediante la regulación de agua a los intestinos. Nombres Comerciales: Hidrasec Nombre Genérico: Racecadotrilo Presentaciones y Vía de Administración: Cápsulas y granulado para administración oral. Sus usos más frecuentes son para: Diarrea Sus usos en general son: Diarrea aguda, es decir, la que tiene una duración inferior a dos semanas. La diarrea puede representar problemas graves de deshidratación, por lo que debe acompañarse el medicamento con el uso de sueros orales cuando se sospeche que pudiera presentarse esta condición. Siga las instrucciones de su médico para una pronta recuperación. Hidrasec Precio Para encontrar el mejor precio de Hidrasec compara varias farmacias en nuestra próxima sección. Precio Farmacias Chedraui Farmatodo Farmacias San Pablo Farmalisto Cápsulas $182 $180 $180 $174 Sobres – $229.50 $209 $207 **Es importante aclarar que estos precios fueron tomados de la farmacia en línea en una investigación hecha por el equipo de quefarmacia en Marzo 2020, los precios pueden modificarse con el tiempo y la sucursal de la farmacia.** Ambas presentaciones de ese medicamento las consigues más económicas en Farmalisto, quién en comparación con otras farmacias, para las cápsulas se encuentra hasta un 8% más accesibles, y en la presentación en sobres te puedes ahorrar hasta el 20% en comparación con Farmatodo. Presentaciones y forma de administración Cápsulas de 100 mg de Racecadotrilo, en cajas de 6 o 9 piezas. Son fabricadas por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec. Granulado de 10 y 30 mg de Racecadotrilo. Viene en cajas con 18 sobres. Es fabricado por Laboratorios Ferrer en la marca comercial Hidrasec . Dosis y usos recomendados por edad Presentación 3 meses a 12 años Adultos Veces al día Cápsulas No 100 mg 3 Granulado 10 a 60 mg No 3 *Consulta a tu médico para recibir la dosis correcta. El granulado se puede disolver en agua, combinarse con algún alimento o usar directamente en la boca del niño. Si no se observan resultados en 5 días, consulte nuevamente a su médico. El tratamiento para pacientes adultos es de un máximo de 7 días. La dosis máxima para adultos es de 400 mg al día. En niños es de 8 mg por kg. Generales. Precaución en personas intolerantes a la fructosa, con ausencia de las enzimas sacarasa e isomaltasa, insuficiencia renal o con síndrome de mala absorción de glucosa y galactosa. Alergias o hipersensibilidad. No se use en personas alérgicas al medicamento. Mezcla con alcohol. El alcohol irrita al aparato digestivo. Además, el alcohol deshidrata el organismo, lo que puede generar complicaciones al combinarse con los efectos de la diarrea. Mezclar con otros medicamentos. No se tiene conocimiento hasta la fecha de interacciones con medicamentos. Combinación de Hidrasec en embarazo y lactancia EMBARAZO MEDIO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Hidrasec, por su ingrediente activo Racecadotrilo, no ha sido clasificado por la FDA (Food & Drug Administration). No se recomienda su uso durante el embarazo por no contarse con estudios en humanos, aunque las pruebas en animales no indican problemas. Según estudios médicos de e-lactancia.org, Hidrasec es compatible con la lactancia y lo considera de muy bajo riesgo. Es además un medicamento apropiado para pediatría, aunque no se tienen estudios suficientes en menores de 3 meses. Efectos secundarios Los efectos secundarios por el uso de este medicamento son mínimos y son similares a los que se obtienen con el uso de placebos. Estos son: Es importante de todas maneras reportar cualquier síntoma al médico. Preste especial atención a los síntomas que pudieran indicar una reacción anafiláctica, es decir, una respuesta alérgica inmediata al medicamento. Estos generalmente se manifiestan con la hinchazón de la cara y la garganta, además de labios y lengua. Fuentes Médicas